

EXPEDIENT 10 EC

INSETTICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA A COCCINIGLIE E MOSCHE BIANCHE

Classificazione IRAC meccanismo di azione 7C

Tipo di formulazione: Emulsione concentrata

Composizione

- Pyriproxyfen puro.....g 10% (= 100 g/l)

- Coformulanti q.b. a.....g 100

Contiene nafta solvente (petrolio), n° CAS 64742,

e 2-etilesile lattato, n° CAS 186817-80-1



SAPEC AGRO ITALIA Srl

Via Varese 25/D – 21047 Saronno

(VA)

Tel: 02 84944669



Autorizzazione Ministero della Salute n. 16420 del 16/06/2016

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440

Setúbal – Portogallo

Distributore: Sapec Agro Italia srl – Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; H315 – Provoca irritazione cutanea; H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H318 – Provoca gravi lesioni oculari; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P261 – Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ gli aerosol; **P264** Lavarsi accuratamente dopo l'uso; P280 – Indossare guanti/ indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301+P310 – In caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 – NON provocare il vomito. P501 – Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: EUH 401 – Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Taglie: 100, 250, 500 ml. 1-5 l.

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici mantenere, per gli agrumi, una fascia di rispetto di 20 m dai corpi idrici superficiali o di 10 m utilizzando ugelli antideriva (75% di riduzione) e, per la frutta, una fascia di rispetto di 25 m o di 15 m con ugelli antideriva (75% di riduzione). Per proteggere gli insetti impollinatori nelle applicazioni in serra, coprire gli alveari durante il trattamento e nelle 48 ore successive. Durante le operazioni di miscela/carico, applicazione e accesso alla zona trattata, l'operatore deve indossare guanti di protezione dagli agenti chimici. Durante l'applicazione su agrumi e pomodori, deve utilizzare indumenti protettivi di tipo 3 o 4 (ermetici a prodotti liquidi) e nelle applicazioni sui pomodori una mascherina di tipo FFP2. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso. Prima di accedere nuovamente, ventilare le serre trattate fino all'essiccazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di primo soccorso. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

EXPEDIENT 10 EC è un insetticida regolatore di crescita attivo per ingestione e contatto, specifico per il controllo delle cocciniglie e delle mosche bianche su diverse colture.

Expedient 10 EC interferisce con i processi di crescita dell'insetto inibendo la metamorfosi, l'embriogenesi e la riproduzione, causandone così la morte. La sua elevata persistenza garantisce un effetto prolungato nel tempo.

CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO

Pomacee (Pero, Melo): contro la cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) intervenire a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti alla dose di 0,04% - 0,05% (40-50 ml/hl) con un volume di acqua fra 700 e 1000 litri/ha. Non superare la dose di 0,5 litri/ha. Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

Drupacee (Pesce, Nattarine, Albicocco, Susino, Ciliegio): contro la cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) intervenire a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti alla dose di 0,04% - 0,05% (40-50 ml/hl) con un volume di acqua fra 700 e 1000 litri/ha. Non superare la dose di 0,5 litri/ha. Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

Agrumi: contro Cocciniglia dell'Olivio (*Saissetia oleae*), Cocciniglia bianca del limone (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia grigia degli agrumi (*Parlatoria pergandei*), Cocciniglia rossa della California (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola degli agrumi (*Lepidosaphes spp*) intervenire alla dose di 0,05 - 0,075% (50-75 ml/hl) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione. Impiegare un volume di acqua compreso fra 1000 e 1500 litri/ha. Dose massima di impiego 1,25 l/ha. Effettuare un solo trattamento all'anno.

Pomodoro (serra) contro mosca bianca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla comparsa delle primissime forme adulte alla dose di 0,05% - 0,075% (50-75 ml/hl) con un volume di acqua compreso fra 1000 e 1500 litri/ha senza superare la dose massima di 1,25 litri/ha. Effettuare un massimo di due interventi all'anno.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU AGRUMI, 3 GIORNI SU POMODORO.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9 comma 3 D.Lvo n. 65/2003) Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.