

BRANCO®

FUNGICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
Azoxystrobin codice FRAC: 11
Folpet codice FRAC: M4

BRANCO

COMPOSIZIONE

100 G di prodotto contengono:

AZOXYSTROBIN g 7,3 (93,5 g/l)

FOLPET puro g 40 (500 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one e un polimero contenente acidi grassi etossilati: può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO ITALIA SRL
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel: +39 0284944669

Stabilimento di produzione:

SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 16871 del 22/02/2017

Partie: 1-2-4-5-10 L

Partita n.:

® marchio in corso di registrazione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Periodo di rientro dei lavoratori nel campo: 48 ore dopo il trattamento.

Durante la preparazione della miscela utilizzare guanti in nitrile o neoprene, occhiali di sicurezza, maschera con filtro, stivali impermeabili in nitrile, tuta da lavoro.

Cambiare i vestiti e lavarsi le mani e il viso con acqua e sapone immediatamente dopo l'utilizzo.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveneni.



ATTENZIONE

DOSI, EPOCHE e MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche

BRANCO è un fungicida multisito ad attività citotropica e di contatto ed azione preventiva efficace nei confronti di numerose patologie della vite: escoriosi, black rot, oidio e peronospora, e di un effetto secondario nei confronti della botrite.

Associa due sostanze attive complementari, Azoxystrobin e Folpet che gli conferiscono un ampio spettro d'azione, una protezione prolungata di foglie e grappoli e un'ottima resistenza al dilavamento.

DOSI, EPOCHE e MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite (da vino)

Malattie	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno
Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Oidio (<i>Erysiphe necator</i>) Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)	2	10-12	3
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	0.75	10-12	2

Contro Peronospora, oidio e black rot intervenire nel periodo compreso fra 7-8 foglie di sviluppo e pre-chiusura grappolo (BBCH 18-77).

Contro Escoriosi (*Phomopsis viticola*) intervenire da germogliamento alla fase di 7-8 foglie (BBCH07-18).

Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura e copertura del grappolo, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiore a 1000 L/ha (es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro.

Con alta pressione della malattia utilizzare l'intervallo più breve.

Preparazione della miscela: Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto senza nessuna prediluizione e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Utilizzare un volume di acqua adeguato per garantire una perfetta bagnatura. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario. Pulire molto accuratamente e lavare gli spruzzatori appena possibile dopo il trattamento.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo. Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina e con gli oli minerali. In quest'ultimo caso attendere almeno 20 giorni dall'intervento con oli minerali.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto potrebbe essere fitotossico per le colture non presenti in etichetta.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.