

MEDEIRO® F WG

Fungicida antiperonosporico a duplice azione
Granuli Idrodispersibili WG

Meccanismo d'azione FRAC code: Fosetyl Al 33 e Folpet M4

MEDEIRO® F WG

COMPOSIZIONE:

| | |
|---------------------|-------|
| Fosethyl Aluminium | g 50 |
| Folpet | g 25 |
| Coformulanti q.b. a | g 100 |

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO ITALIA Srl

Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) - Tel: 02 84944669

Stabilimento di Produzione:

SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal - PT

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16621 del 24/02/2017

Contenuto Netto: 300 g; 1-2-4-5-8-10-12 kg

Partita n. vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

® marchio in corso di registrazione da una società del gruppo Sapec

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
- Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zone non coltivate.
- Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali, guanti ed indumenti protettivi.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

MEDEIRO F WG è un fungicida a base di Fosetyl Alluminio e Folpet, in formulazione microgranulare.

Il Fosetyl Alluminio è rapidamente assorbito dalle foglie e traslocato lungo la vegetazione sia in fase acropeta sia basipeta. Ne consegue una protezione completa, diretta ed indiretta, della vegetazione formata e in via di formazione, grazie allo sviluppo di composti fenolici in grado di bloccare lo sviluppo del fungo e alla produzione di fitoalessine che stimolano le difese naturali della pianta.

Il Folpet invece agisce per contatto, determina l'inibizione della germinazione delle spore e impedisce la penetrazione del micelio fungino all'interno della vegetazione.

MEDEIRO F WG, per effetto della sua duplice attività multisito, si presenta come ideale nell'ambito di una strategia antiresistenza o associato a prodotti a specifico sito di azione al fine di garantirne una prolungata efficacia nel tempo.

DOSI e MODALITA' DI IMPIEGO:

VITE DA VINO: contro *Peronospora (Plasmopara viticola)* intervenire a partire dalla fase di inizio sviluppo dei tralci fino alla fase di invaiatura effettuando un massimo di 3 applicazioni per anno alla dose di 4 kg/ha, ogni 10-14 giorni.

VITE DA TAVOLA: contro *Peronospora (Plasmopara viticola)* intervenire a partire dalla fase di inizio sviluppo dei tralci fino a fine fioritura (BBCH 69) effettuando un massimo di 3 applicazioni per anno alla dose di 4 kg/ha, ogni 10-14 giorni.

Si raccomanda di utilizzare un volume di acqua sufficiente per bagnare l'intera vegetazione, in funzione dell'epoca applicativa e della attrezzatura impiegata.

FITOTOSSICITÀ

Si sconsigliano miscele con fungicidi a base di rame, in particolare negli interventi in apertura di stagione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione sia l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su uva da vino e a fine fioritura su uva da tavola.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.