

NOVITÀ

# Branco

**Fungicida preventivo attivo su numerose patologie della vite.**

Composizione: Azoxystrobin 7,3% (= 93.5 g/l)

+ Folpet 40% (= 500 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)



Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 800 L

CLP: H302 - H317 - H322 - H351 - H410 - EUH208 -

EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: in corso di registrazione

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Fungicida mutisito ad attività citotropica e di contatto ad azione preventiva
- ✓ Effetto complementare delle due sostanze attive che compongono la miscela
- ✓ Ampissimo spettro di azione su più patologie fungine
- ✓ Protezione della vegetazione esistente e del grappolo fino alle fasi avanzate di sviluppo

## VANTAGGI

- ✓ Registrato su quattro diverse patologie della vite (Peronospora, Oidio, Escoriosi e Black rot)
- ✓ Miscela duttile impiegabile in differenti momenti della coltivazione
- ✓ Partner di differenti soluzioni antiperonosporiche ed antioidiche
- ✓ Miscela pronta in sospensione concentrata ad alta adesività e solubilità



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite (da vino)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Oidio ( <i>Uncinula necator</i> ), Black rot ( <i>Guignardia bidwellii</i> )	2 l/ha	Interventi preventivi da 7-8 foglie di sviluppo a pre-chiusura grappolo (BBCH 18-77) ogni 7-10 giorni. Eseguire un massimo di 3 interventi all'anno.
	Escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> )	0.75 l/ha	Intervenire preventivi da germogliamento a 7-8 foglie di sviluppo (BBCH 07-18) ogni 7-10 giorni. Eseguire un massimo di 2 interventi all'anno.



**Intervallo di sicurezza:** 28 giorni.