

NOVITÀ

*Special*

# Coimbra

## Fungicida antiperonosporico endoterapico per lattuga e patata.

Composizione: Dimetomorf 8% (=90 g/l)

+ Propamocarb 44,2% (=500 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

CLP: H410 - EUH401

Registrazione: in corso di registrazione

Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Coimbra e' una inedita miscela fungicida dotata di attività translaminare e sistemica, ad azione preventiva, curativa e antisporulante.
- ✓ Effetto sinergico fra le sostanze attive con importante incremento di efficacia e persistenza rispetto alla miscela estemporanea.
- ✓ Differenti siti di azione (FRAC H5 + F4), nessun rischio di resistenza incrociata.
- ✓ Formulazione liquida, di facile utilizzo e priva di solventi nocivi.
- ✓ Selettivo nei confronti degli organismi utili e non bersaglio.

### VANTAGGI

- ✓ Protezione della vegetazione esistente e di quella in via di sviluppo o piu' nascosta.
- ✓ Rapido assorbimento (2 ore) e resistenza al dilavamento.
- ✓ Perfetta selettività per la coltura.
- ✓ Pienamente inserito nei programmi di gestione delle resistenze.
- ✓ In linea con i requisiti dei programmi di difesa integrata.
- ✓ Effetto collaterale su *Pythium*.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
<b>Patata</b>	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2 l/ha in un volume d'acqua di 500-1000 l/ha	Intervenire da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 4-5 foglie sviluppate) fino alla fase di maturità della coltura/inizio maturazione dei tuberi. Intervenire ogni 7-12 giorni (utilizzare l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia) con un numero massimo di 3 applicazioni per ciclo.
<b>Lattuga (in pieno campo)</b>	Peronospora ( <i>Bremia lactucae</i> )	2 l/ha in un volume d'acqua di 600-1000 l/ha	Intervenire da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-45) ogni 10-12 giorni, utilizzando l'intervallo minore in condizioni di elevata pressione della malattia, con un numero massimo di 3 applicazioni per ciclo produttivo.



**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni prima su lattuga.