

Deltasap

**Insetticida piretroide ad ampio spettro,
concentrato emulsionabile.**

Composizione: Deltametrina 2,8% (=25 g/l)

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

CLP: H226 - H302+H332 - H315 - H318 - H335 - H410

- EUH401     **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 15402 del 10/05/2012

Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Deltasap agisce per contatto.
- ✓ E' dotato di un ampio spettro d'azione, sia su forme giovanili sia su adulti.
- ✓ In particolare, ne è indicato l'impiego contro: afidi, aleurodidi, carpocapsa, cavolaia, cocciniglia mezzo grano di pepe, dorifora, microlepidotteri, mosca della frutta e degli agrumi, nottue, piralide, psilla, ricamatrici, tentredini, tignole, tortrici, tripidi ed altri insetti.

VANTAGGI

- ✓ Elevato potere abbattente e rapida azione iniziale.
- ✓ Breve tempo di carenza.
- ✓ Massima selettività per la coltura.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURE	FITOFAGO	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio	Psilla	75 ml/hl (1 l/ha)	Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni ad intervallo di 14 giorni.
	Afide verde del melo, Afide del pesco, Afidi della frutta, Cydia pomonella, lepidotteri e coleotteri	30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha)	
Vite	Tignole	40-60 ml/hl (0,4-0,7 l/ha)	
	Cicaline	30-50 ml/hl (0,3-0,6 l/ha)	
Olivo	Tignola, mosca dell'olivo	40-60 ml/hl (0,4-0,9 l/ha)	
Cavolfiori, Cavoli a testa, Broccoli - in pieno campo	Lepidotteri, cavolaia, nottue	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 2 interventi ad intervallo
	Afidi	50 ml/hl (0,5 l/ha)	
Patata, Zucchini - in pieno campo	Dorifora, lepidotteri, cavolaia, nottue	30-50 ml/hl (0,5 l/ha)	Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 interventi ad intervallo di 14 giorni.
	Afidi	50 ml/hl (0,5 l/ha)	
Lattughe e altre insalate (esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), pomodoro - in serra	Lepidotteri, cavolaia, nottue	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 2 interventi ad intervallo di 7 giorni.
	Afidi	50 ml/hl (0,5 l/ha)	
Lattughe e altre insalate (esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), pomodoro - in pieno campo	Lepidotteri, cavolaia, nottue	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 interventi ad intervallo di 14 giorni.
	Afidi	50 ml/hl (0,5 l/ha)	
Mais	Nottue	0,3 l/ha	
	Piralide, diabrotica	0,5 l/ha	
Cereali (escluso riso)	Afidi, lepidotteri	0,3 l/ha	
Nocciolo	Afidi	50 ml/ha (0,5 l/ha)	
Ornamentali - in campo	Afidi	50 ml/ha (0,5 l/ha)	



Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su cereali; 7 giorni su olivo, patata, melo, pero, cavolfiore, broccoli, cavoli a testa, susino, ciliegio, lattughe ed altre insalate (esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia) in serra; 3 giorni su lattughe ed altre insalate (esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia) in pieno campo e tutte le altre colture.