

Douro 100 EC

Visita il sito: www.penconazolosapec.it

Fungicida antioidico sistemico preventivo e curativo.

Composizione: Penconazolo 10,2% (=100 g/l)

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

Flacone: 0,25 L

Cartone: 40X0,25 L

Pallet: 500 L



CLP: H315 - H318 - H411 - EUH401



ATTENZIONE

Registrazione: n° 16034 del 30/07/2014

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, attivo nei confronti dell'Oidio della vite e di numerose altre colture.
- ✓ Attività sistemica con azione preventiva, curativa e bloccante.
- ✓ Rapido assorbimento del prodotto anche in condizioni difficili (poche ore).

Flacone: 1 L

Cartone: 12X1 L

Pallet: 600 L



VANTAGGI

- ✓ Su vite effetto collaterale e azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwellii*).
- ✓ Grande efficacia e persistenza del trattamento antioidico che si traducono in qualità e quantità delle uve destinate alla vinificazione.
- ✓ Azione multisito, e ottima miscibilità con la maggior parte dei formulati. Ideale partner di prodotti ad azione specifica in strategia antiresistenza.
- ✓ Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Oidio. Azione collaterale su Black Rot (<i>Guignardia spp.</i>) e Pseudopezia spp.	25-30 ml/hl	Interventi preventivi ogni 12-14 giorni.
		50 ml/hl	In presenza di sintomi della malattia 2 trattamenti ogni 5-7 giorni.
Melo	Ticchiolatura	30-40 ml/hl	Interventi preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce poi ogni 10-15 giorni.
		40-50 ml/hl	Interventi curativi. In presenza di sintomi della malattia 2 trattamenti bloccanti ogni 5-7 giorni.
	Oidio	30-40 ml/hl	Con cadenza settimanale in presenza dei primi sintomi.
	Malattie da conservazione (<i>Penicillium, Monilia</i>)	30-35 ml/hl	2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolto.
Pera	Ticchiolatura	25-35 ml/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni.
		30-40 ml/hl	Trattamenti curativi. In presenza dei sintomi della malattia con 2 trattamenti ogni 5-7 giorni. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Pesco	Oidio	40-50 ml/hl	Interventi preventivi alla caduta petali ogni 10-14 giorni.
	Malattie da conservazione (<i>Penicillium, Monilia</i>)	50 ml/hl	In pre raccolto 2-3 interventi.
Tabacco	Oidio	35-50 ml/hl	Interventi preventivi alla comparsa dei primi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
Melone, Zucchini, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Peperone e Pomodoro in pieno campo, Pisello		25-50 ml/hl	In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione ogni 12-14 giorni a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
Colture ornamentali e da fiore	Oidio e Ruggini	25-50 ml/hl	Ogni 10-14 giorni, a seconda della coltura e della incidenza della malattia.



Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su tutte le colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Su floreali e ornamentali, data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.