

Estuder


Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa in sospensione concentrata.

Composizione: Metalaxyl 3,85% (= 50 g/l) + Rame metallo sotto forma di idrossido 15,4% (=200 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Flacone: 1 L
Cartone: 12X1 L
Pallet: 600 L



CLP: H317 - H410 - EUH401   **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 15580 del 26/11/2012

Tanica: 10 L
Pallet: 500 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Attività fortemente sistemica con azione preventiva e curativa coniugata al forte potere coprente del rame.
- ✓ Indicato sia nelle prime fasi di sviluppo delle colture che nelle fasi finali in virtù dell'ottima selettività. Evitare applicazioni in piena fioritura.
- ✓ Rapido assorbimento del prodotto anche in condizioni difficili (poche ore).

VANTAGGI

- ✓ Elevata capacità di protezione della nuova vegetazione formatasi dopo il trattamento.
- ✓ Importante effetto di contenimento delle principali batteriosi delle colture trattate grazie all'effetto del rame idrossido.
- ✓ Miscela dotata di azione multisito, soluzione ideale per l'inserimento in strategia di contenimento delle resistenze.
- ✓ Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Peronospora	450 ml/hl	Effettuare 2-4 interventi preventivi ogni 12-14 giorni a partire dalla fase di pre fioritura. Particolarmente indicato dalla fase di allegagione in poi.
Pomodoro	Peronospora. Azione collaterale su batteriosi	450 ml/hl	Effettuare 3-4 interventi preventivi ogni 10-12 giorni a partire dalla fase di pieno accrescimento.
Cavolo verza	Peronospora, Alternaria, Bremia	450 ml/hl	Effettuare 3-4 interventi preventivi ogni 10-12 giorni a partire dalla fase di pieno accrescimento.
Carciofo			
Lattuga			
Pisello			
Fragola	Fitoftora	450 ml/hl	Interventi ogni 15-20 giorni dopo il trapianto e 30 giorni dopo il primo intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 3%.
Floreali e ornamentali	Peronospora, Fitoftora	450 ml/hl	Intervenire in condizioni predisponenti la malattia.



Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta su cavolo verza; 40 giorni su fragola; 28 giorni su vite; 20 giorni su pomodoro, pisello, carciofo, lattuga.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Non applicare in piena fioritura o in presenza di basse temperature al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di fitotossicità.
- ✓ Su floreali e ornamentali, dato l'elevato numero di specie e varietà presenti, si consigliano saggi preliminari prima dell'uso. Non applicare comunque in fioritura.
- ✓ Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina.