

Hereu® SC

Erbicida selettivo per Colture arboree, Girasole, Carciofo, Vivai, argini e sedi ferroviarie.

Composizione: Oxyfluorfen 42,9% (=500 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

CLP: H318 - H410 - EUH401   **PERICOLO**

Registrazione: n° 16033 del 04/06/2014

Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 10 L
Pallet: 500 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Controlla un ampio spettro di infestanti annuali, sia graminacee che dicotiledoni, sia in pre che in post emergenza.
- ✓ Hereu® SC forma una barriera impedendo la nascita delle infestanti.

VANTAGGI

- ✓ Hereu® SC è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre emergenza.
- ✓ Hereu® SC è il diserbante ideale nella miscelazione con Montana per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti sulle aree non coltivate. Grazie all'elevata concentrazione di principio attivo Hereu® SC è una soluzione pratica anche nelle aziende di maggiori dimensioni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Poa (*Poa annua*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*).

Hereu è un marchio registrato Sapec Agro.



INFESTANTI CONTROLLATE

Acetosella (*Oxalis spp.*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo (*Chrysanthemum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fiorancio (*Calendula arvensis*), Galinsoga comune (*Galinsoga perviflora*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Ortica (*Urtica spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Stramonio comune (*Datura stramonio*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Veronica (*Veronica spp.*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
Pomacee	1-1,35 l/ha	Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Post-emergenza delle infestanti: vedere etichetta per gli specifici casi.
Drupacee		
Arancio		
Limone		
Pompelmo		
Vite		
Nocciolo		
Mandorlo		
Olivo	1-1,35 l/ha	Intervenire fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo lo sfalcio. Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 1,5 lt/ha di superficie effettivamente trattata.
Girasole	0,5 l/ha	Impiegare su colture seminate ad almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Impiegare HEREU SC® in pre-emergenza della coltura.
Carciofo	0,5-1 l/ha	Il prodotto deve essere impiegato lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre-emergenza della coltura 0,5-0,75 lt/ha; in post-emergenza della coltura 0,75-1 lt/ha di superficie effettivamente trattata.
Vivai di forestali e ornamentali	1-1,75 l/ha	Intervenire prima dell'emergenza delle infestanti annuali. Con specie resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, prima delle emissioni dei nuovi germogli.
Incolti, argini	2-2,5 l/ha	In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5 - 1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata.
Sedi ferroviarie		

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ intervenire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della raccolta su olivo.