

# Kubik® McZ

**Fungicida sistemico per la lotta contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco.**

Composizione: Metalaxil 8% + Mancozeb 64%

Formulazione: Polvere bagnabile (WP)

**Sacchetto:** 1 kg  
**Cartone:** 8x1 kg  
**Pallet:** 400 kg



CLP: H317 - H361D - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 014491 del 15/12/2008

**Sacco:** 10 kg  
**Pallet:** 500 kg



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta alle Peronospacee delle colture Vite, Tabacco e Pomodoro.
- ✓ Elevata sistemica combinata all'azione di copertura del Mancozeb, particolarmente indicato per i trattamenti nelle fasi iniziali.
- ✓ Elevata capacità protettiva nei confronti dei grappoli in via di fioritura e allegagione.

## VANTAGGI

- ✓ Massima protezione della vegetazione esistente e di quella in via di formazione.
- ✓ Particolarmente indicato nei trattamenti di pre e post fioritura.
- ✓ Miscela indicata in strategia antiresistenza in virtù della sua attività multisito.

Kubik è un marchio registrato Sapec Agro.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Peronospora	250 g/hl	Intervenire in via preventiva ogni 12-14 giorni fra accrescimento dei germogli e allegagione avvenuta.
Tabacco	Peronospora tabacina	300 g/hl	Iniziare i trattamenti al termine della fase di post trapianto ogni 10 giorni. E' possibile trattare anche prima del trapianto (1-2 giorni prima della messa a dimora) al fine di garantire la massima protezione in fase di trapianto.
Pomodoro	Phytophthora infestans	250 g/hl	Iniziare i trattamenti dalla fase di post trapianto. Sospendere all'inizio della fioritura.



**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite e tabacco, su pomodoro interrompere i trattamenti prima della fioritura.