

# Medeiro 80 WG Advance

**Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili  
a base di Fosetyl Alluminio.**

Composizione: Fosetyl alluminio 80%

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

CLP: H412 - EUH401

Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012

**Sacchetto:** 1 kg  
**Cartone:** 10x1 kg  
**Pallet:** 500 kg



**Sacco:** 10 kg  
**Pallet:** 500 kg



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Sistemica acropeta e basipeta in grado di garantire una protezione sia della vegetazione esistente che di quella in via di formazione.
- ✓ Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali della pianta con la produzione di Fitolessine, sostanze in grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
- ✓ Particolarmente efficace nei confronti dei Ficomietti, Peronospora e Fitoftora (marciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi delle frutticole.

## VANTAGGI

- ✓ Partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
- ✓ Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.
- ✓ Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
- ✓ Particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico in chiave di strategia antiresistenza.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
<b>Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo)</b>	Fitoftora	250-300 g/hl	Irrorazioni fogliare (massimo 3 trattamenti/anno). Primo trattamento in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.
<b>Vite per uva da vino</b>	Peronospora	250-300 g/hl	Effettuare massimo 4 trattamenti per anno. Iniziare gli interventi in prefioritura e proseguirli. Ad intervalli di 10-14gg.
<b>Pomacee</b>	Fitoftora	250-300 g/hl	Effettuare massimo 3 trattamenti per anno. Iniziare gli interventi: 1° Aprile - 2° Luglio - 3° Settembre / Ottobre.



**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su agrumi e pomacee; 28 giorni per uva da vino.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici.
- ✓ Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori
- ✓ Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione,
- ✓ per cui è raccomandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.