


Acrux 10 WP

Acaricida con azione ovo – larvicida in polvere bagnabile.

Composizione: Exitiazox 10%

Formulazione: Polvere bagnabile (WP)

CLP: H411 - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 16010 del 10/03/2014

Sacchetto: 0,5 kg

Cartone: 10x0,5 kg

Pallet: 250 kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Efficace nei confronti di uova, larve e ninfe degli acari tetranychidi, rossi (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) e gialli (*Eotetranychus carpini*).
- ✓ Esplica anche un'azione sterilizzante sulle femmine.

VANTAGGI

- ✓ Lunga persistenza di azione.
- ✓ Selettivo nei confronti degli insetti utili.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
Vite	Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,50 kg/ha	Impiegare un volume di acqua di 500-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione in presenza di poche forme mobili (1-2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Pompelmo	Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>)	0,150 - 0,375 kg/ha	Impiegare un volume di acqua di 1000-2500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effettuare massimo 1 intervento all'anno.
Tangelo Pomelo			
Ugli			
Arancio			
Bergamotto			
Arancio Amaro			
Chinotto			
Limone			
Limetta			
Mandarino			
Clementina			
Tangerino			
Mineola			
Melo	Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,50 kg/ha	Utilizzare un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.
Pero			
Nashi			
Cotogno			
Nespolo			



Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.