

# Toreador

## Insetticida aficida sistemico

Composizione: Imidacloprid 17,1% (=200 g/l)

Formulazione: Concentrato solubile (SL)

CLP: H411 - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 13477 del 31/07/2009

Flacone: 0,25 L

Cartone: 40x0,25 L

Pallet: 500 L



Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Ampio spettro d'azione.
- ✓ Agisce su numerosi insetti chiave come afidi e aleurodidi.
- ✓ Agisce per ingestione sugli insetti con apparato boccale pungente - suggente e masticatore.

### VANTAGGI

- ✓ Toreador rappresenta la soluzione di riferimento per il controllo di afidi e aleurodidi su un elevato numero di colture.
- ✓ Toreador ha lunga persistenza d'azione ed elevata sistemica nella pianta.
- ✓ Attivo a basse dosi e in presenza di basse temperature.
- ✓ Controlla gli insetti anche quando protetti dalla vegetazione.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
Melo	Afidi	50 ml/hl	Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento. Effettuare i trattamenti solo in post fioritura.
Pero	Eriosoma Microlepidotteri Psilla del melo Tentredine		
Pesco	Afidi		Effettuare i trattamenti solo in post fioritura.
Nettarine	Microlepidotteri		
Susino	Tentredine		
Ciliegio	Metcalfa pruinosa		
Albicocco	Cicaline		
Arancio	Afidi	75 ml/hl	Effettuare i trattamenti solo in post fioritura.
Clementino	Aleurodidi		
Mandarino	Minatrice serpentina delle foglie		
Limone			
Pomodoro	Afidi	50 ml/hl	
Melanzana	Aleurodidi	75 ml/hl	
Peperone	Dorifora		
Cocomero in serra e pieno campo	Afidi	50 ml/hl	In pieno campo effettuare i trattamenti solo in post fioritura.
Melone in serra e in pieno campo	Aleurodidi	75 ml/hl	In pieno campo effettuare i trattamenti solo in post fioritura.
Patata	Afidi	50 ml/hl	
	Dorifora	75 ml/hl	
Tabacco	Afidi	50 ml/hl	
	Altica		
Floreali e ornamentali	Afidi	50 ml/hl	E' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro d'acqua e impiegare questa sospensione distribuendo i quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. In pieno campo effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura su piante ornamentali che fioriscono nell'anno del trattamento.
	Metcalfa		
	Aleurodidi	75 ml/hl	
Platano Ippocastano	Tingide del platano	-	Mediante trattamento endoterapico per iniezione al tronco: contro Tingide del platano, Afidi, Microlepidotteri minatori alla dose di 5-15 ml di prodotto ogni metro di circonferenza del tronco. Si consiglia di trattare prima della comparsa dei fitofagi.
	Afidi		
	Microlepidotteri minartori		



**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni su agrumi, patata e tabacco; 21 giorni su pesco, nettarine, susino e ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero.