

Viseo® 40 SC

Erbicida selettivo ad ampio spettro di azione per le lattughe e scarola.

Composizione: Propyzamide 36,67% (=400 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

CLP: H351 - H412 - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 16113 del 25/07/2014

Flacone: 1 L

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Controlla le infestanti più comuni, sia graminacee sia dicotiledoni ed agisce per via radicale.
- ✓ Viseo 40® SC è attivo contro le cuscute.
- ✓ Viseo 40® SC è altamente efficace nelle prime fase delle infestanti e deve essere applicato su terreno affinato, esplicando la massima efficacia su terreno irrigato.

VANTAGGI

- ✓ Miscelabile con p.a. di pre-emergenza.
- ✓ Completamente selettivo per le colture registrate, consentendo applicazioni in vari stadi di sviluppo delle colture.
- ✓ La Propyzamide è l'unico principio attivo efficace contro le cuscute.
- ✓ Formulazione ad altissima selettività.

Viseo è un marchio registrato Sapec Agro.



INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), falso panico (*Setaria spp.*), fienarola (*Poa spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), loglio italico (*Lolium spp.*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonchè, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. Centocchio (*Stellaria media*), correggiola (*Polygonum aviculare*), cuscuta (*Cuscuta spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), ortica (*Urtica spp.*), papavero (*Papaver spp.*), plantaggine (*Plantago spp.*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (*Portulaca oleracea*), romice (*Rumex spp.*) (da seme), veronica (*Veronica spp.*).

Mediamente sensibili: amaranto comune (*Amaranthus spp.*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), giavone comune (*Echinochloa crusgalli*), poligono nodoso (*Polygonum lapathiofolium*).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	MODALITÀ APPLICATIVE
Lattuga pieno campo e serra	1,875 - 3,75 (l/ha)	Impiegare in pre semina o in pre trapianto della coltura, prima della emergenza delle infestanti. È consigliato in leggero interrimento del prodotto dopo applicazione, in particolare in presenza di suolo siccitoso. In ogni caso si consiglia di effettuare una irrigazione, in assenza di pioggia, entro 24 ore dal trattamento. In caso di avventizie facilmente controllabili è possibile ridurre la dose a 2,75 l/ha. Applicare il prodotto sulla coltura in buono stato vegetativo.
Scarola pieno campo e serra		



Intervallo di sicurezza: intervenire con almeno 28 giorni di anticipo rispetto alla raccolta di entrambe le colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ L'attività erbicida e la persistenza sono esaltate e prolungate da un andamento climatico fresco e umido.
- ✓ Applicare su terreno pulito.
- ✓ Non impiegare su suoli imbevuti di acqua.