

Vitipec MZ

Fungicida preventivo e curativo a base di Cymoxanil e Mancozeb.

Composizione: Cymoxanil 4% + Mancozeb 46,5%

Formulazione: Polvere bagnabile (WP)

Sacchetto: 1 kg
Cartone: 10x1 kg
Pallet: 500 kg



CLP: H317 - H361FD - H410 - EUH401



Registrazione: n° 15219 del 19/12/2011

Sacco: 10 kg
Pallet: 500 kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare.
- ✓ Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante.

VANTAGGI

- ✓ Protezione della vegetazione esistente e delle nuove foglie in via di formazione.
- ✓ Elevata micronizzazione delle particelle che garantisce una ottima solubilità e miscibilità.
- ✓ Spiccata capacità protettiva nei confronti del grappolo di vite e della vegetazione.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

| COLTURA | AVVERSITA' | DOSE | MODALITA' APPLICATIVE |
|----------|----------------------------|--------------|---|
| Vite | Peronospora | 200-300 g/hl | Impiegare dalla fase di accrescimento dei tralci fino ad allegagione avvenuta/accrescimento acini, ogni 10-12 giorni. In ogni caso proseguire fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Importante effetto collaterale su escoriosi. |
| Patata | Peronospora, Alternaria | 250-300 g/hl | Impiegare in presenza delle condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora ogni 10-12 giorni. In caso di presenza di attacchi di alternaria, aumentare da dose a 300-350 g/hl. |
| Pomodoro | | | |
| Tabacco | Peronospora | 300-350 g/hl | Impiegare in presenza delle primissime infezioni di malattia. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili. |



Intervallo di sicurezza: 28 giorni per tutte le colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.